VIERNES, 17 DE JUNIO DEL 2016 • Cardenal, 1. Monforte • redac.monforte@lavoz.es • www.lavozdegalicia.es/lemos/ • Teléfono: 982 416 014 • ISSN 1888-5101

La Voz de Lemos

Maltrato
El Juzgado admite la querella presentada por los animalistas contra el ganadero de Axulfe
Pag. 3

Patrimonio
La visión de los sexos en la iconografía de as iglesias románicas de la Ribeira Sacra
Pag. 4

Las lluvias complican la cosecha en los viñedos de Ribeira Sacra

El mal tiempo en pleno cuajado de los racimos preocupa a los viticultores

LUIS DÍAZ
MONFORTE / LA VOZ

Muchos cosecheros de Ribeira Sacra ponían la venda antes de la herida hace un par de semanas, cuando los ataques de mildiu comenzaron a asomar con cierta intensidad en los viñedos. «A ver quen paga a uva este ano», se escuchaba decir a algún viticultor. Los pronósticos negativos, un tanto exagerados entonces, podrían acabar por cumplirse al menos en algunas zonas. Las fuertes lluvias y la bajada de temperaturas afectan a la floración del fruto en muchas viñas. En otras palabras, podrían impedir el cuajado de buen número de racimos. Habrá que esperar, en todo caso, a que se complete esa fase del ciclo vegetativo de la vid para tener una estimación fiable de las pérdidas.

Es muy difícil aventurar los efectos de la inesperada invernía del mes de junio sobre la floración de los racimos. En una misma zona de viñedo —ya no subzona— unos hablan de «cosechón» y otros recurren sin rodeos a la palabra «catástrofe». La disparidad de criterios y de opiniones está justificada por la variabilidad orográfica de la Ribeira Sacra, que propicia que haya lugares donde el fruto esté cuajado y otros donde ese proceso todavía no ha concluido. Es en estos últimos donde ahora está en juego buena parte del volumen de la cosecha.

«Hasta el fin de semana no lo sabré con exactitud, pero los trabajadores que están en la viña me dicen que fue un desastre. La lluvia y el frío echaron a bajo la flor», dice José María Prieto. En su viña, de doce hectáreas, el ciclo vegetativo de las vides no es uniforme. A mayor altitud, más retraso en la mencía. Otras variedades, como el albarello, ni siquiera iniciaron la floración. «Hay zonas que se salvan, pero lo grueso está muy tocado. Voy a tener que notificar los daños al seguro», señala Prieto.

Foto tomada ayer de un racimo en floración en un viñedo de la ribera de Diomondi. ROI FERNÁNDEZ

PRONÓSTICOS

APARENTE MEJORÍA

Sol desde el sábado

Los pronósticos indican que hoy aún podría caer algún chubasco ocasional. A partir del sábado, al influencia anticiclónica propiciará el regreso del buen tiempo. No se descartan tormentas, sin embargo, a mediados de semana

> La floración sigue ritmos muy dispares en función del emplazamiento de los viñedos

Los viñedos de Régoa, su bodega, están en Amandi. En esa misma subzona tiene alguna parcela Ramón Marcos Fernández, de Adega Cruceiro. Ayer se esmeraba en enramar las cepas para que la ventilación del racimo ayude a prevenir nuevos ataques de hongos. «Non sei no que temos en Doade, pero aquí desflorou un 90% e hai moi boa colleita», apunta este viticultor. Por lo que respecta a la incidencia del mildiu, no observa problemas más allá de la aparición de algunas manchas aisladas en las hojas de las vides.

Pedro Rodríguez, de Adegas Guímaro, considera que es muy prematuro evaluar la incidencia de las condiciones meteorológicas sobre la cosecha. Según señala, solo cuando acaben de cuajar los racimos se verá con claridad si las expectativas en cuanto a cantidad son buenas o si hay que revisarlas a la baja. De momento, aprecia «moita desigualdade» en los ritmos de la floración según las viñas.

> «Hai xente que dá un tratamento e logo non a volves ver en moito tempo pola ribeira»

«Tes a viña ben e dun día para outro aparece toda chea de mildeu», dice un viticultor de Goián, una de las parroquias de Pantón acogidas a Ribeira Sacra. Es uno de los municipios donde hay más quejas por la presencia de ese hongo en los viñedos. Las zonas en ladera mejor aireadas parecen resistir mejor sus efectos, aunque no solo orografía y altitud influyen en el estado sanitario de las vides. «Hai xente que dá un tratamento e logo non a volves ver na ribeira. Na viña fan falta tamén práticas culturais, e non sempre se poden facer se só estás nela os fins de semana», apunta un cosechero de Amandi.

La primavera, desde luego, no está siendo nada favorable para el viñedo. Aunque también es cierto que los últimos años posiblemente hayan resultado apacibles en exceso en cuanto a incidencia de las plagas. «Houbo anos que case non fixo falta dar tratamentos», señala un viticultor de Doade. Alguno incluso le ve el lado bueno a las lluvias de esta primavera. «Hai moita rama e iso tamén protexe ao acio da auga na floración», sugiere un bodeguero de la misma subzona.

Otro enemigo peor

La subida de las temperaturas que se anuncia a partir de mañana contribuirá a completar el cuajado del racimo en las zonas donde no se ha completado. Pero también incrementará el riesgo de ataques de hongos debido a las elevadas concentraciones de humedad. Muchos técnicos sostienen que el principal peligro para la cosecha no está en el mildiu, sino en las infecciones de oídio que se puedan producir a partir de ahora.

AENOR
ER
Empresa Registrada
UNE-EN ISO 9001

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

[a] pinguela
IES

ENSINO PÚBLICO CALIDADE CERTIFICADA